Un complément des traitements des hypophosphatémies et des hypokaliémies

Phosphore

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE
VACHES
PRÉSENTOIR DE 4 FLACONS X 500 ML

CONSTITUANTS	PROPRIÉTÉS RECONNUES
Acide orthophosphorique, Phosphate dipotassique, Phosphate de Magnésium	La carence en Phosphore est souvent impliquée dans les rechutes des fièvres de lait. L'apport par voie veineuse n'est actif que pendant 90 minutes, le relai par voie orale est indispensable.
Monopropylène Glycol	Le Propylène Glycol est un précurseur du glucose, il limite les risques de déficit énergétique et permet d'augmenter l'apport énergétique sans risque d'acidose tout en diversifiant en toute sécurité les voies métaboliques.

03.07.2015

ESPÈCES CIBLÉES

VACHES

QUAND L'UTILISER

Lors de rechute de fièvre de lait avec calcémie normale et lors d'hypophosphatémie ou d'hypokaliémie durant lesquelles l'apport de Calcium peut être néfaste.

MODE D'EMPLOI

Faire avaler lentement 500 ml sur vache debout en s'assurant d'une bonne déglutition. A renouveler au besoin toutes les 12 heures, 3 fois.

PRÉSENTATION

Présentoir de 4 flacons de 500 ml

Obione
Créons ensemble vos solutions
Produits diététiques - Logiciels
Outils de diagnostic - Alimentation
Formations - Audits - Appuis terrain

Obione - ZAC Grand Sud - 239 Rue Fernand Leger - 71000 MACON - **www.obione.fr**